

MAXILENE®

LIDOKAIN 4%

Lokalanestetikum för ytanestesi


MAXILENE - TRE VIKTIGA FÖRDELAR

För effektiv
smärtlindring



Avancerad liposomal beredning^{4,5}

- Möjliggör snabbt upptag och snabb penetration
- Ger snabbare effekt



Maxilene jämförelse

	TILLSLAGS- TID	FÖREKOMST AV HUD- IRRITATION	PRILOKAIN (kårsamman- dragning)
MAXILENE® LIDOKAIN 4%	30 min ^{2,3,6}	Låg ^{1,2}	Nej
Emla/Tapin	60 min ⁷	Låg ¹	Ja

Förskrivningsinformation

Se FASS för fullständig information.

Maxilene™ förskrivningsinformation:

Indikation: Lokalanestetikum för topikal användning avsett för kutan ytanestesi inför venkanylering eller venpunktion på vuxna och barn som är minst en månad gamla. Spädbarn 1-3 mån: Högst 1g kräm, max 1tim. Spädbarn 3-12 mån: Högst 1g, max 4 tim. Över 12 mån: 1-2,5g, max 5 tim.

Administrering av smärtsamma topikala behandlingar på större intakta hudtytor då det är lämpligt att använda ett topikalt bedövningsmedel, endast på vuxna. Administrering: Se bipacksedel för detaljerad information. Applicera ett tjockt lager på hudområdet som ska bedövas och massera in om det ej ska täckas. Vänta i minst 30 minuter för effekt. Vid hudirritation avsluta omedelbart och kontakta medicinsk personal. Vid behov använd täckplåster. Endast för externt bruk. Innehåller benzylalkohol som konserveringsmedel.

ANVÄND EJ NÄRA ÖGON.

ANVÄND EJ PÅ SKADAD HUD.

Förvaras i rumstemperatur.

Datum för senaste uppdaterad produktresumé: 2017-11-30

Maxilene 30g kräm. Artikelnr. 078955.

Kartong med tub, 1 x 30 g.

Hållbarhet i oöppnad tub är 3 år. Öppnad 6 månader

Maxilene ingår i högkostnadsskyddet.

Rx, Får förskrivas av sjuksköterskor



För mer information se www.fass.se


References: 1) Taddio et al, CMAJ 2005; 172(13): 1691-96. 2) Koh et al, Pediatric Anesthesia 2004; 14: 977-98. 3) LMX4 Summary of Product Characteristics, TGA August 2011. 4) Nestor, Journal of Drugs in Dermatology 2006, 5(7): 618-20. 5) Mezei M in Health DS, ed. Drug permeation enhancement. New York NY: Marcel Dekker Inc; 1994: 171-98. 6) Kleber et al, Pediatrics 2002; 100(4). 7) Emla Product Information March 2010.

1 SNABBT TILLSLAG

Smärtlindring efter 30 minuter¹

Effektiv smärtlindring med Maxilene¹

- Smärtlindringen efter 30 min är likvärdig med Emlas efter 60 min.³



*p=0.04


Graph adapted from Koch et al, 2004. Randomised double-blind comparison study of Maxilene and emla for tropical anaesthesia in children undergoing IV insertion

2 VÄLTOLERERAD

Låg förekomst av hudirritation

Låg nivå av hudirritation med Maxilene¹

- Endast 2,9% upplever hudirritation



- Innehåller ej Prilokain som kan orsaka methemoglobinemi och vasokonstriktion (som kan försvåra venpunktion)
- Från 1 månads ålder

Graph adapted from Taddio et al, 2005. Liposomal lidocaine to improve procedural success rates and procedural pain, double-blinded randomised placebo controlled 142 patient study.

3 EFFEKTIVT

Tidsbesparande

Effektivt redan efter 30 minuter¹

Kan vara applicerat upp till 5 timmar (Vuxna och barn över 12 mån)

Minimal kärlkonstriktion - snabbare venpunktion



Maxilene är lämplig vid:

- Venkanylering/venpunktion
- Vaccinationer
- Provtagningar
- Enklare kirurgiska ingrepp

AnthropPharma

Distribueras i Sverige av Anthrop Pharmaceuticals AB. Berga Backe 2, 182 53 Danderyd.
Tel: +46 (0)8-243660, info@anthroppharma.com
www.anthroppharma.com